Drugs.com
Know more. Be sure.

Effetti collaterali del dimetilsolfossido

Revisionato dal punto di vista medico da Drugs.com. Ultimo aggiornamento il 24 ottobre 2021.

Per il consumatore

Si applica al dimetilsolfossido: soluzione intravescicale

Effetti collaterali che richiedono cure mediche immediate

Insieme ai suoi effetti necessari, il dimetilsolfossido può causare alcuni effetti indesiderati. Sebbene non tutti questi effetti collaterali possano verificarsi, se si verificano potrebbero aver bisogno di cure mediche.

Verificare immediatamente con il medico se si verifica uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati durante l'assunzione di dimetilsolfossido:

- Congestione nasale
- mancanza di respiro o respiro affannoso
- eruzioni cutanee , orticaria o prurito
- gonfiore del viso

Alcuni pazienti possono provare qualche disagio durante il tempo in cui questo medicinale viene introdotto nella vescica. Tuttavia, il disagio di solito diminuisce ogni volta che viene utilizzato il medicinale.

Il dimetilsolfossido può farti avere un sapore simile all'aglio entro pochi minuti dall'introduzione del medicinale nella vescica. Questo effetto può durare per diverse ore. Può anche far sì che l'alito e la pelle abbiano un odore simile all'aglio, che può durare fino a 72 ore.

Gestione degli effetti collaterali (informazioni generali)

Per gli operatori sanitari

Si applica al dimetilsolfossido: liquido di composizione, soluzione di irrigazione, soluzione topica

dermatologico

Frequenza non riportata : Odore sulla pelle (può persistere per 72 ore) [Ref]

Gastrointestinale

Frequenza non riportata : sapore simile all'aglio (pochi minuti dopo l'instillazione), odore nell'alito (può persistere per 72 ore) [Ref]

Genito-urinario

Frequenza non riportata : Cistite chimica [Rif]

Locale

Frequenza non riportata : Grave disagio alla somministrazione [Rif]

Riferimenti

1. "Informazioni sul prodotto. Dimetilsolfossido (dimetilsolfossido)." Mylan Institutional (formalmente Bioniche Pharma USA Inc), Canonsburg, Pennsylvania.

Ulteriori informazioni

Consulta sempre il tuo medico per assicurarti che le informazioni visualizzate in questa pagina si applichino alle tue circostanze personali.

Alcuni effetti collaterali potrebbero non essere segnalati. Puoi segnalarli alla FDA .